

사용설명서 (CAPSULES)

Riva Star는 지각과민을 즉각적으로 완화해주는 새로운 세대의 지각과민치료제입니다.

용도:

상아질 지각과민증 치료

사용금지:

은, 불소, 요오드, 칼륨, 암모니아 등에 알러지를 가진 갑상선 치료를 받는 환자들에게 사용하지 마십시오. 참고: 의심스러운 경우, 사용 전에 의사나 알러지 전문의와 상의하십시오.

사용방법:

1. 러버컵에 불소가 함유되어 있지 않은 연마제를 사용하여 치료할 치아를 깨끗이 닦아내십시오.
2. 치아 상태를 확인하여 건강한 덴틴과 에나멜만 치료해야 합니다.
3. 코튼롤을 이용하여 치료할 치아를 격리시키십시오.
4. 치료할 치아와 인접한 치은 조직을 건조시키십시오.
5. 치아와 Interproximal 공간을 1mm 이하 정도 살짝 덮도록, 치은 조직에 소량의 Gingival Barrier(SDI Limited)를 도포하십시오. Fanning motion으로 광증합 하십시오. 참고: 한 곳에만 집중하여 광증합하지 마십시오. 이는 치은에 버닝을 초래할 수 있습니다. 격리하기 위해 러버댐으로 대체 가능합니다.
6. 시술 부위가 오염되지 않도록 바세린이나 코코아 버터 등으로 노출된 치은 조직이나 입술을 보호합니다.
7. Riva Star Step 1: 실버 브러시를 사용하여 실버 캡슐의 호일을 뚫고 용액을 시술부위에만 주의 깊게 도포합니다.
8. Riva Star Step 2: 즉시, 그린 브러시를 사용하여 그린 캡슐의 호일을 뚫고 시술 부위에 충분한 양의 용액을 Creamy White 색이 투명해질 때까지 도포합니다. (만약 이 침전물이 투명해지지 않으면 얼룩이 생기게 됩니다.) 참고: Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 용액이 도포된 모든 치아 표면에 동일하게 그린 캡슐의 용액을 도포하십시오.
9. Blot Dry하십시오.
10. 구강 내 치은보호제(SDI-Gingival Barrier)를 제거하십시오.

투여량:

- Riva Star Step 1한 방울과 Riva Star Step 2두 방울로 환자 당 5개 정도의 치아를 치료할 수 있습니다.
- 한 번의 진료 시 환자 당 Riva Star Step 1과 Riva Star Step 2 각각 한 캡슐로 투여량이 제한됩니다. 만약 재적용이 필요하다고 판단되는 경우, 1주일 이후에 사용할 수 있습니다.

주의사항:

- 전문가만 사용하십시오.
- 임신부나 수유 중인 여성에게 치료를 반복하지 마십시오.
- 치료 전 환자에게 얼룩이 생기는 부분에 대해 알려주십시오.
- Riva Star Step 1을 적용하기 전에, Gingival Barrier(SDI Limited)를 도포하여 연조직을 보호하십시오.
- 구강 내 연조직, 눈, 피부 등에 Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 용액이 접촉되지 않게 하십시오. 만약 우발적으로 접촉하였다면, 아래 "응급처치"를 참조하십시오.
- Riva Star Step 2(그린 캡슐)의 용액이 눈과 접촉하지 않게 하십시오.
- 얼룩이 생길 수 있으므로 소프트 덴틴에 지각 과민 치료하지 마십시오.
- 참고: 만약 얼룩이 생겼을 경우, 인산이 함유된 퍼미스 파우더로 적절하게 폴리싱하고 셀프큐어 글래스 아이오노머 시멘트(Riva Self Cure, SDI Limited)로 수복함으로써 얼룩을 줄일 수 있습니다.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 섭취하지 마십시오.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 얼룩을 생성합니다. (아래 "얼룩 처리"를 참조하십시오.)
- 사용 시 글러브와 보호안경을 착용하십시오.
- 재사용을 금지합니다.
- 유효기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
- 경고: 연방법에 따라 치과 의사의 주문에 의해서만 판매할 수 있도록 제한합니다.
- Riva Star Step 1(실버 캡슐)은 불소 이온 0.06g/ml 를 함유하고 있습니다.
- SDS는 www.sdi.com.au 또는 SDI를 통해 제공 가능합니다.

저장과 핸들링:

- 사용할 준비를 마치기 전까지 Riva Star 실버 캡슐이나 그린 캡슐의 호일을 뚫지 마십시오.
- 2~8도 사이의 서늘하고 어두운 곳에 보관하십시오.
- 20~25도 사이의 실온에서 사용하십시오.

응급처치:

- 눈(접촉): 흐르는 물로 눈을 계속 씻으십시오. 의사가 중단을 지시할 때까지 또는 최소 15분 이상 흐르는 물로 닦아내고 의사의 진찰을 받으십시오.
- 피부/구강(접촉): 오염된 옷을 벗고 흐르는 물로 씻어내십시오. (딱지가 생기는 경우, 24~48시간 내에 사라져야 합니다.)
- 섭취: 복용량에 따라 다르기에 예상할 수 없습니다. 만약 섭취하였다면, 구토를 유도하지 마십시오. 우유 또는 물 한잔을 제공하십시오. 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 흡입: 복용량에 따라 다르기에 예상할 수 없습니다. 흡입하였을 경우, 오염지역에서 벗어나십시오.

얼룩 처리:

- 피부: Riva Star Step 1(실버 캡슐)의 피부 접촉 시, Riva Star Step 2(그린 캡슐)를 부드럽게 문지르며 도포하면 얼룩은 천천히 사라질 것입니다. 만약 Riva Star Step 2를 도포하지 않으면 몇 일이 지난 후에 얼룩은 점차적으로 사라져야 합니다.
- 옷: 오염된 옷을 제거하고 직물 얼룩 제거제 등을 이용하여 하루 담가 두었다가 평상시처럼 세탁하십시오.
- 단단한 면: 즉시 가정용 표백제(sodium hypochlorite)로 표백한 후 물로 씻어내십시오. 지우기 힘든 얼룩의 경우, 종이 냅킨에 가정용 표백제를 충분히 적신 다음 해당 부위를 닦아내십시오. 하루가 지난 이후 물로 닦아내십시오.

포장:

키트

- 10 x Riva Star Step 1 (Silver single dose)
- 10 x Riva Star Step 2 (Green single dose)
- 10 x Micro brush (Silver)
- 10 x Micro brush (Green)
- Accessories

US Patents granted.



Last revision: 10-2020